

**No alle droghe !
Ma quali sono le droghe ?**

L'allucinogeni

L' **LSD** è una droga allucinogena di sintesi che viene commercializzato sotto forma di pillole di varia dimensione, di piccoli francobolli, o zollette di zucchero. La composizione del prodotto è varia e incerta, così come i dosaggi: si pensa che esistano diversi tipi di LSD. L'LSD è un'unica sostanza ma compare sul mercato con diversi tagli (amfetamine, ecstasy, stricnina). I tagli influenzano fortemente gli effetti, in particolare, gli effetti più tardi.

La **PCP** (fenciclidina), altra sostanza allucinogena di sintesi, può essere ingerita o fumata. Essa viene spesso addizionata ad altre sostanze per potenziarne gli effetti.

L'**LSD**, e la fenciclidina (PCP) possono essere anche fumati. Raramente gli allucinogeni sono assunti per via endovena.

Effetti:

Non esistono veri e propri effetti stabili, poiché l'esperienza è fortemente soggettiva, imprevedibile e caotica, varia a seconda del contesto e della personalità coinvolta. Gli effetti soggettivi dipendono da: dose, ambiente, via di somministrazione, personalità di chi ne abusa.

Una reazione tossica comune a tutti gli allucinogeni è il viaggio, **trip**. Tale effetto dura dalle quattro alle dodici ore, ma può prolungarsi per giorni o mesi, in quanto gli allucinogeni sono liposolubili e permangono nei depositi adiposi diversi tempo dopo l'assunzione. Persona che hanno sperimentato il viaggio provano il fenomeno del flash-back, istanti nei quali si ha l'impressione di rivivere la situazione psichedelica originale, anche quando la sostanza non è stata assunta.

Può causare l'insorgenza di **Bad Trip** (attacco di panico, talora episodi psicotici transitori) e flash back che persistono per mesi dopo l'interruzione dell'uso. Il problema più grave può essere l'insorgenza di una psicosi cronica, probabilmente legata alla slatentizzazione di elementi psicopatologici in personalità ad elevata vulnerabilità.

L'uso prolungato può provocare psicosi; personalità fragili e vulnerabili possono rimanere gravemente squilibrate per moltissimo tempo, fino ad arrivare a danneggiare permanentemente l'equilibrio psichico.

L'overdose:

casi di morte che si sono verificati sotto l'effetto di LSD e di altri allucinogeni derivano da azioni incontrollate dovute all'alterata percezione della realtà circostante. Se assunti da persona immature o vicine all'adolescenza possono esserci forti rischi di influenze negative nello sviluppo del pensiero consapevole e della concezione del mondo. *I segni dell'overdose:*

- innalzamento grave della temperatura
- emorragia
- comportamenti autodistruttivi
- coma

L'anfetamina

Le amfetamine sono sostanze stimolanti utilizzate in guerra per aumentare la capacità di concentrazione e la rapidità di riflesso dei soldati. Sotto il nome di Simpamina venivano utilizzate dagli studenti negli anni '60 per aumentare la capacità di studio e la fatica, sono state usate e sono contenute tuttora in alcuni farmaci contro l'obesità perché riducono la sensazione di fame. Vengono spacciate sotto forma di pasticche, raramente in polvere.

La maggior parte dell'amfetamina prodotta illegalmente è il solfato di anfetamina che si presenta sotto forma di polvere, in pasticche o capsule.

L'uso regolare può creare assuefazione e un forte desiderio per la sostanza, nel tempo si possono avere seri problemi fisici e mentali.

Effetti psicofisiologici:

- aumento della capacità di attenzione e di vigilanza
- riduzione del bisogno di dormire
- riduzione dell'appetito e della stanchezza
- facilità di parola
- sensazione di potenza

Assumendo l'amfetamina si ha quindi la sensazione di aver maggior prontezza di riflessi, fiducia e benessere; scompaiono le sensazioni di fame e fatica, ma non scompare il bisogno dell'organismo di cibo e riposo.

Complicazioni psicofisiologiche:

- spossatezza
- irritabilità e insonnia
- sintomi depressivi
- ossessioni e manie di persecuzione
- psicosi
- incapacità di valutare correttamente le proprie percezioni e i comportamenti
- comportamento violento
- chiusura in sé e isolamento

Quando termina l'effetto dell'anfetamina si ha un crollo: ci si sente spossati, irritabili, depressi. Ben presto l'organismo sviluppa **tolleranza** ad alcuni degli effetti gratificanti delle

amfetamine, quali gli effetti euforizzanti e anoressizzanti, e ciò porta chi ne abusa a prendere una maggiore quantità di amfetamina per evitare il crollo.

Un uso prolungato di anfetamina oltre a provocare una forte diminuzione di peso, può essere causa di psicosi, il consumatore può avere manie di persecuzione, credere di essere seguito oppure perseguitato, anche con una sola assunzione si possono manifestare stati psicotici.

Rechtsanwälte Ferner & Kollegen

**Bunsenstr. 18
69115 Heidelberg
Tel. 06221/ 1318-0**

**Kaiserstr. 38
76133 Karlsruhe
Tel. 0721/ 964 71-0**

**Josef-Görres-Platz 2
56068 Koblenz
Tel. 0261/ 914 37 02**